

Мигреноподобные состояния.

Мигрень относится к сосудистым заболеваниям, и ~~часто~~ проявляется ~~чаще~~ повторяющимися острыми приступами ~~боли головы~~ головной боли. Боль ~~бывает~~ обычно возникает в одной части ~~стороне~~ головы и может длиться до трёх суток.

Своё название эта болезнь получила от греческого слова «гемикрания», которое переводится как «половина головы». Это заболевание не связано с климатом, местом жительства, расой. У женщин данное заболевание возникает намного чаще, чем у мужчин. Мигрень может начинаться в раннем подростковом или юношеском возрасте, а в течение жизни постепенно исчезнуть. Во время мигрени не происходит колебаний артериального давления и не повышается внутричерепное давление.

Отформатировано: По ширине,
Отступ: Первая строка: 1,25 см

Эту болезнь условно делят на два вида. Существуют два вида мигрени:

1. Мигрень обычная, протекающая без ауры.
2. Мигрень, имеющая ауру или классическая.

Аура – это наличие симптомов, вызывающих нарушения зрения, слуха и др. Может проявляться двигательными и психическими расстройствами. Период ауры может протекать от 4 минут до часа. К данному Этому виду можно отнести подвержены около 15% всех больных мигренью.

Отформатировано: По ширине,
Отступ: Первая строка: 1,25 см

Причины мигрени неизвестны. Возникновение её связано с неврозами, стрессом, нервным и физическим перенапряжением. Иногда появление болезни связано с употреблением алкоголя (чаще всего шампанского, красного вина, пива), е употреблением рыбы, орехов, шоколада, сыра. У многих женщин мигрень возникает в предменструальный период или связана с приёмом контрацептивов. Недостаточный или избыточный сон, изменения погоды, смена климатических поясов, также могут спровоцировать мигрень. Имеется Существует еще и генетическая предрасположенность к мигрени.

У детей, как и у взрослых, могут быть мигреноподобные состояния, но их выявление очень затруднено трудно определить. Приступы головной боли бывают менее продолжительными, чем у взрослых. Характерно наличие тошноты и рвоты.

Отформатировано: По ширине,
Отступ: Первая строка: 1,25 см

Различают несколько состояний. Можно выделить несколько состояний, которые предшествуют возникновению предшествующих мигрени:

Отформатировано: Цвет шрифта:
Красный

Отформатировано: Русский
(Россия)

Отформатировано: Русский
(Россия)

Отформатировано: Шрифт: 11 пт,
Русский (Россия)

1. Приступы циклической рвоты, начиная с 4-х раз за час, которые могут длиться идти в течение 4 часа или пяти дней. Признаки желудочно-кишечных расстройств не выявляются.
2. Приступы абдоминальной мигрени, длящиеся которые продолжаются от 4 часа до трех суток, когда болит середина живота, при этом может быть возможна тошнота, рвота, бледность. Протекает без признаков желудочно-кишечных заболеваний.
3. Приступы доброкачественного пароксизмального головокружения, длящиеся которые продолжаются несколько минут или несколько часов.

Со временем эти синдромы В дальнейшем эти синдромы могут перейти в обыкновенную мигрень.

Так как возникновение мигрени связано с нервно-эмоциональными перегрузками, то в борьбе с этим заболеванием, самая главная задача заключается на первом месте стоит в устранение последствий стресса. То есть Т.е. – это снятие спазма с дыхательной мускулатуры, мышц малого таза, верхней апертуры грудной клетки. При этом восстанавливается кровообращение и происходит иннервация внутренних органов, а также снимается устраняется привычное напряжение с мимических и жевательных мышц. Этим мы Тем самым мы нормализуем динамику движения костей черепа в режиме кранио – как Кромвель ритма: шеквординамику и кровообращение головного мозга.